

벼 이삭거름 사용 및 이삭도열병 방제적기 고시

고품질 해남쌀 생산을 위한 벼 이삭거름 사용 및 이삭도열병 방제적기를 알려드리오니 실천하여 주시기 바랍니다.

구분(이앙일)	품 종 별		출 수 기	이삭거름 사용	이삭도열병 방제
1모작 (5. 20 ~ 6. 10)	중 생 종	히토메보레(봉황벼)	8. 4 ~ 8. 9	7. 21 ~ 7. 26	7. 30 ~ 8. 4
	중만생종	새누리, 일미, 새일미, 해품, 신동진, 하리아미	8. 14 ~ 8. 18	7. 21 ~ 7. 26	8. 10 ~ 8. 14
2모작 (6. 11 ~ 6. 25)	중 생 종	히토메보레(봉황벼)	8. 11 ~ 8. 15	7. 27 ~ 8. 1	8. 6 ~ 8. 11
	중만생종	새누리, 일미, 새일미, 해품, 신동진, 하리아미	8. 19 ~ 8. 23	7. 26 ~ 7. 30	8. 13 ~ 8. 19

※ 직파재배의 경우 1모작은 5. 10일 이전, 2모작은 5. 10일 이후 파종 기준임

이삭거름 사용

- ▶ 이삭거름 사용량(10a) : N-K(18-0-16) 복합비료 10~11kg
- 벼 잎색이 짙은 논(거름기가 많은 논)은 칼리비료만 3~4kg 사용

※ 완효성 복합비료를 사용한 논은 이삭거름을 사용하지 않음

이삭도열병 방제

이삭패기 7~1일 전 침투이행성 약제로 살포

- ▶ 일 반 재 배 : 골드미, 공중전, 논브라, 논카바, 루틴, 삼각편대, 신호탄, 오후라, 울크린, 헬리건 등
- ▶ 친환경재배 : 박도열, 문도대장골드, 포엑스, 황토유황 등 유기목록공시농자재

※ 이삭도열병 방제 시 잎집무늬마름병, 벼멸구, 나방류 등 동시 방제

이삭거름 적량사용과 적기방제로 “고품질 쌀”을 생산합시다.

2017년 7월 17일



해 남 군 수
해남군농업기술센터소장