

여름철 고온기

벼 병해충

주의하세요!



전라남도농업기술원

먹노린재

먹노린재



7~8월에 약충과
성충이 벼 줄기에
구침을 박고 흡즙

피해답



피해가 심하면 수확량
에 큰 영향을 줌





먹노린재 방제는 이렇게

- ☞ 작은 충격이나 소리에도 줄기속이나 물속으로 숨어 방제가 어렵기 때문에 **논물을 빼고 해질무렵 적용약제를 충분히 살포해주세요**
- ☞ 예년에 먹노린재가 발생했던 지역은 철저한 예찰과 방제가 필요합니다.



잎집무늬마름병

- ☞ 증상 : 벼 밑동 부근 잎집에서 회색 얼룩무늬가 생긴 후 차츰 잿빛으로 변해 말라 죽음
- ☞ 7월 이후 고온 다습한 상태가 지속될 때 발생
- ☞ 벼에 발생하는 병해 중 발생면적과 감수율이 가장 높은 병해



잎집무늬마름병 방제는 이렇게

- ➡ 과다하게 밀식된 논, 비료기가 많아 과번무된 논
위주 중점 방제
- ➡ 약제 방제는 발병주율 20%정도일 때 효과적
- ➡ 이삭패기 전 철저한 방제로 상위엽 진전 억제
- ➡ 벼대 아래 잎집에 약이 묻도록 충분한 양 살포

문의 기술보급과 이정훈 ☎ 061-330-2774